

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CALCIUM HASCO

115,6 mg jonów wapniowych / 5 ml, syrop
(*Calcii glutionas anhydricus* + *Calcii lactobionas dihydricus*)

Syrop o smaku bananowym

Należy przeczytać uważnie całość ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby móc na niego liczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Calcium HASCO ostro i nie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby móc na jej podstawie przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Je li objawy nasiliły się lub nie ustąpiły, należy skontaktować się z lekarzem.
- Je li nasiliły się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpił jakiegokolwiek objaw niepożądany niewymieniony w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Calcium HASCO i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium HASCO
3. Jak stosować lek Calcium HASCO
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Calcium HASCO
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CALCIUM HASCO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Calcium HASCO to lek zawierający sole wapnia. Wapń jest składnikiem budulcowym organizmu oraz odgrywa ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych (utrzymaniu prawidłowego krzepnięcia krwi, kurczliwości mięśni, przewodnictwa nerwowego, czynności błon komórkowych). Wapń zmniejsza także przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych działając przeciwwąskowicie i przeciwozbrodnikowo. Wapń przenika przez błony i do mleka kobiecego.

Wskazaniemi do zastosowania leku Calcium HASCO są profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie np. w okresie ciąży lub karmienia piersią, leczenie osteoporozy oraz wspomagające leczenie objawów alergii.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CALCIUM HASCO

Kiedy nie stosować leku Calcium HASCO

Nie należy stosować leku Calcium HASCO jeżeli występuje:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, ciękną niewydolnością nerek, przy przedawkowaniu witaminy D), zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciuria), ciężka niewydolność nerek, kamica nerkowa, blok przedsionkowo-komorowy.

Kiedy zachować szczególnie ostrożność stosując lek Calcium HASCO

Zachować ostrożność stosując lek u osób z niewydolnością nerek i przyjmujących duże dawki witaminy D.

Stosowanie leku Calcium HASCO z innymi lekami

Wysokie dawki wapnia przyjmowane wraz z niektórymi lekami nasercowymi (glikozydami naporstnicy lub blokerami kanału wapniowego), mogą wywołać poważne zaburzenia czynności serca. Wapń znacznie zmniejsza wchłanianie niektórych antybiotyków (z grupy tetracyklin) oraz chinolonów, lewotyroksyny, nitrofurantoiny, bisfosfonianów, chloropromazyny, penicylaminy, leków obniżających krzepliwość krwi i związków fluoru. Dlatego zaleca się, aby odstąpić pomiędzy przyjęciem syropu Calcium HASCO oraz wymienionych leków wynosić około 3 godzin.

Leki moczopędne z grupy tiazydów zmniejszają wydalanie, a witamina D zwiększa wchłanianie wapnia.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersi

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Calcium HASCO

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CALCIUM HASCO

Lek Calcium HASCO jest przeznaczony do podawania doustnego. Syrop należy dawkować za pomocą dołączonej do opakowania miarki.

Dawkowanie:

Dorośli: 15 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Dzieci: do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę,
od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jakąkolwiek lek, lek Calcium HASCO może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występują zaburzenia ośrodkowo-jelitowe (zaparcia, biegunka). Podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, której towarzyszą nudności, bóle brzucha, bóle kości, osłabienie mięśni), może wystąpić głównie u osób z zaburzeniami czynności nerek.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CALCIUM HASCO

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Calcium HASCO po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Calcium HASCO

Substancjami czynnymi leku są organiczne sole wapnia (glukonolaktobionian oraz laktobionian) w ilości odpowiadającej 115,6 mg jonów wapniowych w 5 ml syropu.

Inne składniki leku to sacharoza, sodu benzoian (E 211), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), aromat bananowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Calcium HASCO i co zawiera opakowanie

Opakowanie leku Calcium HASCO zawiera 150 ml syropu o barwie białej.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Migrodzka 242 E

tel.: (71) 352 95 22

faks: (71) 352 76 36

Dział Informacji o Leku

tel. (22) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data opracowania ulotki: 29-08-2013 r.