

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CALCIUM HASCO

115,6 mg jonów wapniowych / 5 ml, syrop
(*Calcii glutionas anhydricus + Calcii lactobionas dihydricus*)

Syrop o smaku malinowym

Należy przeczytać uważnie całość ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Calcium Hasco ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeżeli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Calcium Hasco i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Hasco
3. Jak stosować lek Calcium Hasco
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Calcium Hasco
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CALCIUM HASCO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Calcium Hasco to lek zawierający sole wapnia. Wapń jest składnikiem budulcowym organizmu oraz odgrywa ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych (utrzymaniu prawidłowego krzepnięcia krwi, kurczliwości mięśni, przewodnictwa nerwowego, czynności błon komórkowych). Wapń zmniejsza także przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych działając przeciwwąskowo i przeciwobrzękowo. Wapń przenika przez błonę łożyskową i do mleka kobiecego.

Wskazania do stosowania:

- profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie np. w okresie ciąży lub karmienia piersią,
- leczenie osteoporozy,
- wspomagające leczenie objawów alergii.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CALCIUM HASCO

Kiedy nie stosować leku Calcium Hasco

Jeżeli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne (sole wapnia) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku;

Jeżeli u pacjenta występuje podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, cięzką niewydolnością nerek, przy przedawkowaniu witaminy D);

Jeżeli u pacjenta występuje zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciuria);

Jeżeli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek lub kamica nerkowa;

Jeżeli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Calcium Hasco

Jeżeli u pacjenta występuje niewydolność nerek;
Jeżeli pacjent przyjmuje duże dawki witaminy D.

Stosowanie innych leków

Wysokie dawki wapnia przyjmowane wraz z niektórymi lekami nasercowymi (glikozydami naparstnicy lub blokerami kanału wapniowego), mogą wywołać poważne zaburzenia czynności serca. Wapń znacznie zmniejsza wchłanianie niektórych antybiotyków (z grupy tetracyklin) oraz chinolonów, lewotyroksyny, nitrofurantoiny, bisfosfonianów, chlorpromazyny, penicylaminy, leków obniżających krzepliwość krwi i związków fluorków. Dlatego zaleca się, aby odstąpić pomiędzy przyjęciem syropu Calcium Hasco oraz wymienionych leków o około 3 godzin.

Leki moczopędne z grupy tiazydów zmniejszają wydalanie, a witamina D zwiększa wchłanianie wapnia.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Calcium Hasco

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CALCIUM HASCO

Lek Calcium Hasco należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce lub przez lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli: 15 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Dzieci: do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę,

od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Syrop należy dawkować za pomocą dołączonej do opakowania miarki.

W przypadku wrażliwości, działanie leku Calcium Hasco jest za mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie w ciąży - zalecana dawka leku Calcium Hasco

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leku Calcium Hasco. W razie przyjęcia w ciąży zalecanej dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowaniem leku Calcium Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Calcium Hasco może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występują rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

- zaburzenia ośdkowo-jelitowe (zaparcia, biegunka),
- u osób z zaburzeniami czynności nerek, podawanie doustnie dużych dawek wapnia prowadzi do hiperkalcemii, której objawami są: nudności, bóle brzucha, bóle kości i osłabienie mięśni.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpi jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWA LEK CALCIUM HASCO

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Okres ważności leku po pierwszym otwarciu to 6 miesięcy.

Nie stosować leku Calcium Hasco po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Calcium Hasco

Substancjami czynnymi leku są organiczne sole wapnia (wapnia glukonolaktobionian bezwodny oraz wapnia laktobionian dwuwodny) w ilości odpowiadającej 115,6 mg jonów wapniowych w 5 ml syropu.

Ponadto lek zawiera: sacharozę, sodu benzoian (E 211), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), aromat malinowy, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Calcium Hasco i co zawiera opakowanie

Opakowanie leku Calcium Hasco zawiera 150 ml syropu o barwie różowej.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Miodowa 242 E

tel.: (071) 352 95 22

faks: (071) 352 76 36

Dział Informacji o Leku

tel. (022) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data opracowania ulotki: 31.03.2014 r.