

## ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

### CALCIUM HASCO ALLERGY

115,6 mg jonów wapniowych / 5 ml, syrop  
(*Calcii glubionas anhydricus* + *Calcii lactobionas dihydricus*)

#### Syrop bez sztucznych barwników i substancji smakowych

**Należy przeczytać uważnie całość ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Calcium Hasco Allergy ostro i nie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeżeli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

#### Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Calcium Hasco Allergy i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Hasco Allergy
3. Jak stosować lek Calcium Hasco Allergy
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Calcium Hasco Allergy
6. Inne informacje

### 1. CO TO JEST LEK CALCIUM HASCO ALLERGY I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Calcium Hasco Allergy to lek zawierający sole wapnia. Wapń jest składnikiem budulcowym organizmu oraz odgrywa ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych (utrzymaniu prawidłowego krzepnięcia krwi, kurczliwości mięśni, przewodnictwa nerwowego, czynności błon komórkowych). Wapń zmniejsza także przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych działając przeciwnowotworowo i przeciwozrostkowo. Wapń przenika przez błony i do mleka kobiecego.

Wskazania do stosowania:

- profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie np. w okresie ciąży lub karmienia piersią,
- leczenie osteoporozy,
- wspomagające leczenie objawów alergii.

### 2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CALCIUM HASCO ALLERGY

#### Kiedy nie stosować leku Calcium Hasco Allergy

Jeżeli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne (sole wapnia) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku;

Jeżeli u pacjenta występuje podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, cięknawym nerek, przy przedawkowaniu witaminy D);

Jeżeli u pacjenta występuje zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciuria);

Jeżeli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek lub kamica nerkowa;

Jeżeli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy.

### **Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Calcium Hasco Allergy**

Jeżeli u pacjenta występuje niewydolność nerek;

Jeżeli pacjent przyjmuje duże dawki witaminy D.

### **Stosowanie innych leków**

Wysokie dawki wapnia przyjmowane wraz z niektórymi lekami nasercowymi (glikozydami naparstnicy lub blokerami kanału wapniowego), mogą wywołać poważne zaburzenia czynności serca. Wapń znacznie zmniejsza wchłanianie niektórych antybiotyków (z grupy tetracyklin) oraz chinolonów, lewotyroksyny, nitrofurantoiny, bisfosfonianów, chloropromazyny, penicylaminy, leków obniżających krzepliwość krwi i związków fluoru. Dlatego zaleca się, aby odstąpić pomiędzy przyjęciem syropu Calcium Hasco Allergy i wymienionych leków wynosząc około 3 godzin.

Leki moczopędne z grupy tiazydów zmniejszają wydalanie, a witamina D zwiększa wchłanianie wapnia.

*Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.*

### **Ciąża i karmienie piersią**

*Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.*

### **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

### **Ważne informacje o niektórych składnikach leku Calcium Hasco Allergy**

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

## **3. JAK STOSOWAĆ LEK CALCIUM HASCO ALLERGY**

Lek Calcium Hasco Allergy należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce lub przez lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli: 15 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Dzieci: do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę,

od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Syrop należy dawkować za pomocą dołączonej do opakowania miarki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Calcium Hasco Allergy jest za mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

### **Zastosowanie w ciąży i zalecane dawki leku Calcium Hasco Allergy**

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leku Calcium Hasco Allergy. W razie przyjęcia większych dawek leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

### **Pominięcie zastosowania leku Calcium Hasco Allergy**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## **4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE**

Jak każdy lek, lek Calcium Hasco Allergy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Działania niepożądane występują rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

- zaburzenia ośrodkowo-jelitowe (zaparcia, biegunka),
- u osób z zaburzeniami czynności nerek, podawanie doustnie dużych dawek wapnia prowadzi do hiperkalcemii, której objawami są: nudności, bóle brzucha, bóle kości i osłabienie mięśni.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

## **5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CALCIUM HASCO ALLERGY**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Okres ważności leku po pierwszym otwarciu to 6 miesięcy.

Nie stosować leku Calcium Hasco Allergy po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## **6. INNE INFORMACJE**

### **Co zawiera lek Calcium Hasco Allergy**

Substancjami czynnymi leku są organiczne sole wapnia (wapnia glukonolaktobionian bezwodny oraz wapnia laktobionian dwuwodny) w ilości odpowiadającej 115,6 mg jonów wapniowych w 5 ml syropu.

Ponadto lek zawiera: sacharozę, sodu benzoian (E 211), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), wodę oczyszczoną.

### **Jak wygląda lek Calcium Hasco Allergy i co zawiera opakowanie**

Opakowanie leku Calcium Hasco Allergy zawiera 150 ml syropu o barwie białej.

### **Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Międzyzdrój 242 E

tel.: (071) 352 95 22

faks: (071) 352 76 36

Dział Informacji o Leku

tel. (022) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

**Data opracowania ulotki:** 18-09-2013 r.