

## Ulotka dla pacjenta

**Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.**

- Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek HASCERAL ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

### **HASCERAL**

(Urea + Acidum salicylicum)

**(100 mg + 50 mg)/g, maść**

#### **Skład**

1 g maści zawiera  
substancje czynne:

Mocznik ( <i>Urea</i> )	100 mg
Kwas salicylowy ( <i>Acidum salicylicum</i> )	50 mg

i substancje pomocnicze:

Polisorbat 40, sorbitanu trójoleinian, Simulsol 165, glicerol, wazelina biała

Jedno opakowanie leku (tuba aluminiowa) zawiera 50 g maści.

#### **Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego**

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

#### **Spis treści ulotki:**

1. Co to jest lek Hasceral i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Hasceral
3. Jak stosować lek Hasceral
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Hasceral
6. Inne informacje

#### **1. Co to jest lek Hasceral i w jakim celu się go stosuje**

Hasceral, maść zawiera 10% mocznika i 5% kwasu salicylowego.

10% mocznik wywołuje efekt keratolityczny, co prowadzi do złuszczenia warstwy rogowej naskórka. Wpływa również na rozmiękczenie nadmiernie zrogowaciałych warstw naskórka, a także odnawia płaszcz ochronny skóry, co w znaczącym stopniu ogranicza zwrotną utratę wody przez powłoki skórne.

Kwas salicylowy w stężeniu 5 % wywołuje złuszczenie komórek naskórka. Efekt jego działania jest dwukierunkowy. Polega na redukowaniu przylegania komórek przez rozpuszczanie substancji międzykomórkowej oraz na zmniejszeniu pH w warstwie rogowej, co sprzyja nawodnieniu i zmiękczeniu naskórka. W efekcie dochodzi do utraty spójności między komórkami, ich oddzielania się i złuszczenia.

Kwas salicylowy i mocznik poprzez zmianę pH na powierzchni skóry działają również przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo.

Wskazaniami do stosowania leku Hasceral są choroby przebiegające z zaburzeniem rogowacenia naskórka takie jak rybia łuska, łuszczyca, łupież czerwony mieszkowy, nadmierne rogowacenie dłoni i stóp, rogowacenie mieszkowe, ponadto alergiczny i niealergiczny wyprysk dłoni, neurodermit, atopowe zapalenie skóry oraz stany nadmiernego wysuszenia skóry o różnej etiologii.

## **2. Zanim zastosuje się lek Hasceral**

**Nie należy stosować leku Hasceral**, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

### **Zachować szczególną ostrożność stosując lek Hasceral**

Nie stosować na uszkodzoną skórę oraz w okolicy oczu i błon śluzowych.

Nie stosować maści na większe powierzchnie skóry, a jedynie miejscowo.

### **Ciąża**

*Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.*

Z uwagi na wchłanianie przez skórę, preparaty zawierające kwas salicylowy nie powinny być stosowane na duże powierzchnie skóry u kobiet w ciąży.

### **Karmienie piersią**

*Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.*

Z uwagi na wchłanianie przez skórę, preparaty zawierające kwas salicylowy nie powinny być stosowane na duże powierzchnie skóry u kobiet karmiących piersią.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

### **Stosowanie innych leków**

Brak danych.

*Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.*

## **3. Jak stosować lek Hasceral**

*Lek Hasceral należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.*

Do stosowania na skórę.

Maść wcierać w zmienione chorobowo miejsca na skórze 1 do 2 razy na dobę.

Stosować przez kilka lub kilkanaście dni, przy dłuższym stosowaniu wprowadzić przerwy.

Lek zmywa się pod wpływem ciepłej wody, dlatego po umyciu należy ponownie nałożyć maść.

*W przypadku wrażenia, że działanie leku Hasceral jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.*

### **W przypadku zażycia większej dawki leku Hasceral niż zalecana**

Przy podaniu miejscowym przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne.

## **W przypadku pominięcia dawki leku Hasceral**

*Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.*

## **4. Możliwe działania niepożądane**

*Jak każdy lek, lek Hasceral może powodować działania niepożądane.*

Zastosowanie leku zgodnie z opisanym dawkowaniem i wskazaniem nie wiąże się z istotnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Niekiedy może dojść do miejscowego podrażnienia skóry.

*U niektórych osób w czasie stosowania leku Hasceral mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.*

## **5. Przechowywanie leku Hasceral**

*Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.*

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

*Nie należy stosować leku Hasceral po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.*

## **6. Inne informacje**

*W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:*

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. (071) 352 95 22

Dział Informacji o Leku

tel. (022) 742 00 22

**Data opracowania ulotki:**