

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

NIFUROKSAZYD 200 HASCO

200 mg, tabletki powlekane

(Nifuroxazidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazania lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tabletki, aby w razie potrzeby móc je ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeżeli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
- Jeżeli po upływie 3 dni nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane, i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane
3. Jak stosować lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane, i w jakim celu się go stosuje

Nifuroksazyd wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących zakażenia jelitowe. Działa na ziarniaki Gram-dodatnie z rodzajów *Staphylococcus* i *Streptococcus* oraz drobnoustroje Gram-ujemne (*Salmonella*, *Shigella*, *Klebsiella*, *Escherichia*). Nie działa na bakterie z rodzajów *Proteus*, *Pseudomonas*, *Providentia*. Nie zaburza prawidłowej równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego.

Nifuroksazyd działa szybko, wyłącznie w świetle jelit, nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie wywiera działania ogólnego. Jest szybko wydalany z organizmu.

Wskazania do stosowania

Lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane stosuje się w ostrej lub przewlekłej bieguncie w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

Kiedy nie stosować leku Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane:

- jeżeli pacjent ma uczulenie na nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenie i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nifuroksazyd 200 Hasco należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podczas leczenia niezbędne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów.

Jeżeli biegunka utrzymuje się po 2 lub 3 dniach leczenia lub w przypadku nasilenia biegunki podczas stosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Picie alkoholu w trakcie leczenia może wywołać reakcję przejawiającą się nasiloną biegunką, wymiotami, bólem brzucha.

Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane, z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować równocześnie nie z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw.

Ciąża i karmienie piersi

W ciąży i w okresie karmienia piersi lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nifuroksazyd 200 Hasco może powodować senność oraz zaburzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Nifuroksazyd 200 Hasco zawiera ócienie pomarańczowe, która może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazania lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 600 do 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Bez porozumienia z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

Zastosowanie w okresie ciąży - zalecane dawki leku Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

W przypadku przedawkowania należy spowodować wymioty i zgłosić się do lekarza.

W razie przyjęcia w okresie ciąży zalecanych dawek leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

Należy przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jakąkolwiek lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nifuroksazyd jest zwykle dobrze tolerowany. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości objawiające się skórnymi odczynami alergicznymi.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane

- Substancją czynną leku jest nifuroksazyd w ilości 200 mg w tabletkce.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian, otoczka tabletkowa: Opadry II o składzie: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, celuloza chinolinowa, lak (E 104), talk, tytanu dwutlenek (E 171), celuloza pomarańczowa (E 110), indygokarmin, lak (E 132).

Jak wygląda lek Nifuroksazyd 200 Hasco, tabletki powlekane, i co zawiera opakowanie

Jedno opakowanie leku zawiera 12 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
51-131 Wrocław, ul. Miłogrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: