

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Nifuroksazyd HASCO ostro i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

NIFUROKSAZYD HASCO

(Nifuroxazidum)

100 mg, tabletki powlekane

Skład

1 tabletkę powlekaną zawiera:

Substancje czynne

Nifuroksazyd (*Nifuroxazidum*) 100 mg

Substancje pomocnicze

Skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian. Skład otoczki (Opadry II HP 85F22064 Yellow): alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, lak aluminiowy żółci chinolinowej E104, talk, tytanu dwutlenek, żółcie pomarańczowa E110, lak aluminiowy indygo-karminy E132.

Dostępne opakowanie

1 opakowanie leku zawiera 24 tabletki powlekane (1 blister) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

SPRZEDSI BIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. migrodzka 242 E

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane
3. Jak stosować lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane
4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane
6. Inne informacje

1. Co to jest lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

Nifuroksazyd wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących zakażenia jelitowe. Lek działa na ziarniaki Gram-dodatnie z rodzaju *Staphylococcus* i *Streptococcus* oraz drobnoustroje Gram-ujemne (*Salmonella*, *Shigella*, *Klebsiella*, *Escherichia*). Nie działa na bakterie z rodzaju *Proteus*, *Pseudomonas*, *Providentia*. Nie zaburza prawidłowej równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego.

Lek działa szybko, wyćwicznie w świetle jelit, nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie wywiera działania ogólnego. Jest szybko wydalany z organizmu.

Wskazania

Lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane stosuje się w ostrej lub przewlekłej bieguncie w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

2. Zanim zastosuje się lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

Nie należy stosować leku, jeśli występuje nadwrażliwość na nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Zachować szczególnie ostrożność przy stosowaniu leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

Podczas leczenia niezbędne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów.

Jeśli biegunka utrzymuje się po 2 lub 3 dniach leczenia lub w przypadku nasilenia biegunki podczas stosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenie dotyczy sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane z jedzeniem i pićm

Lek należy stosować równocześnie z zachowaniem cisłej diety z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw.

Stosowanie leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane u dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat.

Ciąża i karmienie piersi

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek uważany jest za bezpieczny i nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych bieżących w ruchu.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie alkoholu w trakcie leczenia może wywołać reakcję objawiającą się nasiloną biegunką, wymiotami, bólem brzucha.

3. Jak stosować lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 600-800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

W przypadku wrażliwości na działanie leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane jest to mocne lub za silne, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zwiększenia dawki leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane nie zalecana

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku przedawkowania nifuroksazydu, należy spowodować wymioty i zgłosić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

Należy przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane może powodować działania niepożądane.

Nifuroksazyd jest zwykle dobrze tolerowany. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości objawiające się skórnymi odczynami alergicznymi.

5. Przechowywanie leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Nifuroksazyd HASCO, tabletki powlekane po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

SPRZEDSI BIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Migrodzka 242 E

tel. (071) 352 95 22

Dział Informacji o Leku

tel. (022) 742 00 22

Data opracowania ulotki: 2008-07-17 r.