

Ulotka dla pacjenta

**Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.**

- *Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.*
- *Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.*
- *Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.*

## NIFUROKSAZYD HASCO

(Nifuroxazidum)

220 mg/5 ml, zawiesina doustna

### Skład

1 miarka (5 ml) zawiera:

#### Substancje czynne

Nifuroksazyd 220 mg

#### Substancje pomocnicze

Metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy, karbomer, sacharyna sodowa, sodu wodorotlenek, kwas cytrynowy jednowodny, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, glicerol, aromat bananowy i woda oczyszczona.

### Dostępne opakowanie

Butelka o pojemności 100 ml zawierająca nie mniej niż 100 g zawiesiny, w tekturowym pudełku z miarką do podawania leku.

### Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

### Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna
3. Jak stosować lek Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna

## 6. Inne informacje

### **1. Co to jest lek Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna i w jakim celu się go stosuje**

Nifuroksazyd wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących zakażenia jelitowe. Lek działa na ziarniaki Gram-dodatnie z rodzaju *Staphylococcus* i *Streptococcus* oraz drobnoustroje Gram-ujemne (*Salmonella*, *Shigella*, *Klebsiella*, *Escherichia*). Nie działa na bakterie z rodzaju *Proteus*, *Pseudomonas*, *Providentia*. Nie zaburza prawidłowej równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego. Lek działa szybko, wyłącznie w świetle jelit, nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie wywiera działania ogólnego. Jest szybko wydalany z organizmu.

### **Wskazania**

Lek Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna stosuje się w ostrej lub przewlekłej bieguncie w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

### **2. Zanim zastosuje się lek Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna**

#### **Nie należy stosować leku Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna, jeśli**

występuje nadwrażliwość na nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Nie należy stosować leku u wcześniaków i noworodków (do 1 miesiąca).

#### **Zachować szczególną ostrożność stosując lek Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna**

Podczas leczenia niezbędne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów.

Jeśli biegunka utrzymuje się po 2 lub 3 dniach leczenia, lub w przypadku nasilenia biegunki podczas stosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

*Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.*

#### **Stosowanie leku Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna z jedzeniem i piciem**

Lek należy stosować równocześnie z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw.

#### **Ciąża i karmienie piersią**

*Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.*

Nie zaleca się stosowania leku Nifuroksazyd HASCO u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

#### **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

**Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna**

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesu oraz propylu parahydroksybenzoesu lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

**Stosowanie innych leków**

*Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.*

Spożywanie alkoholu w trakcie leczenia może wywołać reakcję objawiającą się nasiloną biegunką, wymiotami, bólem brzucha.

**3. Jak stosować lek Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna**

Lek podaje się doustnie.

Przed użyciem energicznie wstrząsnąć do uzyskania jednolitej zawiesiny.

Dzieci 1-30 miesięcy: od 220 mg do 660 mg, czyli od 1 miarki (5 ml) do 3 miarek (15 ml) na dobę w 2-3 dawkach podzielonych.

Dzieci powyżej 30 miesięcy: 660 mg, czyli 3 miarki (15 ml) na dobę w 3 dawkach podzielonych.

Nie podawać wcześniakom i noworodkom (do 1 miesiąca).

Do opakowania dołączona jest miarka (5ml).

Stosować nie dłużej niż 7 dni.

*W przypadku wrażenia, że działanie leku Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.*

**W przypadku zażycia większej dawki leku Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna niż zalecana**

*W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.*

W przypadku przedawkowania nifuroksazydu, należy spowodować wymioty i zgłosić się do lekarza.

**W przypadku pominięcia dawki leku Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna**

*Należy przyjąć ją tak szybko jak jest to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.*

#### **4. Możliwe działania niepożądane**

*Jak każdy lek, lek Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna może powodować działania niepożądane.*

Nifuroksazyd jest zwykle dobrze tolerowany. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości objawiające się skórnymi odczynami alergicznymi.

#### **5. Przechowywanie leku Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna**

*Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.*

*Nie należy stosować leku Nifuroksazyd HASCO, zawiesina doustna po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.*

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

#### **6. Inne informacje**

*W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:*

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. (071) 352 95 22

Dział Informacji o Leku

tel. (022) 742 00 22

**Data opracowania ulotki**

**2008 -06- 17**