

Ulotka dla pacjenta

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić; nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

VINPOCETINE HASCO

(*Vinpocetinum*)

5 mg, tabletki

Skład

1 tabletkę zawiera

Substancję czynną:

winpocetyna (*Vinpocetinum*) 5 mg

substancje pomocnicze:

Laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Dostępne opakowanie

Jedno opakowanie leku zawiera 50 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Vinpocetine Hasco i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Vinpocetine Hasco
3. Jak stosować lek Vinpocetine Hasco
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Vinpocetine Hasco
6. Inne informacje

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15

1. Co to jest lek Vinpocetine Hasco i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera jako substancję czynną winpocetynę.

Winpocetyna jest związkiem stosowanym w leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

Lek Vinpocetine Hasco stosuje się w:

- leczeniu psychicznych i neurologicznych objawów niewydolności krążenia mózgowego,
- leczeniu przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka,
- leczeniu zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym.

2. Zanim zastosuje się lek Vinpocetine Hasco

Nie należy stosować leku Vinpocetine Hasco:

- jeśli występuje nadwrażliwość (uczulenie) na winpocetynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
- w ostrej postaci choroby niedokrwiennej serca i ciężkich zaburzeniach rytmu serca,
- ostrej fazie udaru krwotocznego,
- w okresie ciąży i karmienia piersią,
- u dzieci ze względu na brak wystarczających badań klinicznych w tej grupie wiekowej.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Vinpocetine Hasco

- u pacjentów ze schorzeniami alergicznymi w wywiadzie i u pacjentów leczonych alkaloidami *Vinca minor*,
- w czasie długotrwałego leczenia należy monitorować parametry biochemiczne krwi,
- zaleca się kontrolę zapisu EKG w przypadku zespołu wydłużonego odcinka QT (zmiany w elektrokardiogramie) lub stosowania dodatkowego leku powodującego wydłużenie odcinka QT.

Należy się skonsultować z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Vinpocetine Hasco z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku.

Stosowanie leku Vinpocetine Hasco u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie zaleca się zmian w dawkowaniu u pacjentów z chorobami nerek lub wątroby.

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15

Stosowanie leku Vinpocetine Hasco u pacjentów w podeszłym wieku

Nie zaleca się zmian w dawkowaniu u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Podawanie winpocetyny u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Podawanie winpocetyny u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących wpływu winpocetyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vinpocetine Hasco

Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy o tym poinformować lekarza przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

W pojedynczych przypadkach winpocetyna nasila hipotensyjne (obniżające ciśnienie tętnicze krwi) działanie α -metylodopy, dlatego podczas stosowania takiej terapii skojarzonej zaleca się regularną kontrolę ciśnienia krwi.

Należy zachować ostrożność stosując winpocetynę w skojarzeniu z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, jak również z lekami przeciwarrytmicznymi (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca) i przeciwzakrzepowymi (leki zmniejszające krzepliwość krwi) oraz glibenklamidem (lek stosowany w cukrzycy).

3. Jak stosować lek Vinpocetine Hasco

Lek Vinpocetine Hasco należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dorośli: 1 – 2 tabletki (5-10 mg) 3 razy na dobę.

Dawka podtrzymująca: 1 tabletką (5 mg) 3 razy na dobę.

Lek należy przyjmować po posiłku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Vinpocetine Hasco jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Vinpocetine Hasco niż zalecana

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Brak danych dotyczących przedawkowania.

W przypadku pominięcia dawki leku Vinpocetine Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Vinpocetine Hasco może powodować działania niepożądane.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów stosujących lek):

- zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie - objawy te mogą być związane z chorobą podstawową,
- zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia krwi), uderzenia krwi do głowy,
- nudności, zgaga i suchość w jamie ustnej,
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,
- alergiczne odczyny skórne,
- obniżenie odcinka ST (zmiany w elektrokardiogramie), wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i dodatkowy skurcz serca - objawy te ustępowały samoistnie i dlatego nie jest pewne, czy powodem wystąpienia tych objawów było zastosowanie winpocetyny.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

- bóle brzucha,
- leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych).

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

4. Przechowywanie leku Vinpocetine Hasco

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Vinpocetine Hasco po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, chronić od światła i wilgoci.

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. (071) 352 95 22

Dział Informacji o Leku

tel. (022) 742 00 22

Data opracowania ulotki:

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15

2008-07-21