

Ważna informacja o bezpieczeństwie leku zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Tadalafil Mensil, 10 mg, tabletki (tadalafil)

Materiał edukacyjny dla farmaceutów dotyczący bezpiecznego stosowania produktu leczniczego. Realizując dodatkowe środki minimalizacji ryzyka dla produktu leczniczego Tadalafil Mensil (tadalafil) w dawce 10 mg, tabletki oraz w trosce o bezpieczeństwo jego stosowanie, niniejszym w załączeniu przekazujemy materiał edukacyjny dla farmaceutów zawierający istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania tego produktu.

1. Wskazania do stosowania produktu leczniczego Tadalafil Mensil.

Produkt leczniczy Tadalafil Mensil przeznaczony jest do leczenia zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Aby lek zadziałał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Zaburzenia erekcji (dawniej określane jako impotencja) oznaczają brak możliwości uzyskania lub utrzymania sztywności prącia, wystarczającej do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego. Przyczyną zaburzeń erekcji mogą być choroby układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia hormonalne, przyjmowanie określonych leków, stosowanie używek (alkohol, tytoń), stres, a także choroby o podłożu psychologicznym (m.in. zaburzenia depresyjne). Zaburzenia erekcji są ważnym sygnałem, który powinien skłonić pacjenta do zgłoszenia się do lekarza w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki i identyfikacji schorzenia leżącego u podstaw problemu. Brak identyfikacji choroby podstawowej nie wyklucza jednak możliwości podjęcia farmakoterapii u pacjentów, u których nie ma przeciwwskazań do jej zastosowania. Tadalafil Mensil zawiera 10 mg substancji czynnej Tadalafil, selektywnego odwracalnego inhibitora specyficznej fosfodiesterazy cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP) typu 5 (PDE5). Jeśli stymulacja seksualna spowoduje miejscowe uwolnienie tlenu azotu, zahamowanie aktywności PDE5 poprzez tadalafil prowadzi do zwiększenia stężenia cGMP w ciałach jamistych. Powoduje to relaksację mięśni gładkich i napływ krwi do tkanek członka, doprowadzając do erekcji.

2. Kto może stosować produkt leczniczy Tadalafil Mensil.

Produkt leczniczy Tadalafil Mensil stosowany jest w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Stosowanie produktu leczniczego Tadalafil Mensil u dzieci i młodzieży oraz u kobiet nie jest właściwe w leczeniu zaburzeń erekcji.

Nie wolno stosować produktu Tadalafil Mensil u mężczyzn z chorobami serca, u których nie jest wskazana aktywność seksualna.

Ponadto, stosowanie tadalafilu jest przeciwwskazane w następujących grupach pacjentów:

- w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu,
- pacjenci jednocześnie zażywający organiczne azotany (patrz punkt 4),
- pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeżyli zawał mięśnia sercowego lub udar,
- pacjenci z niestabilną dławicą piersiową lub z bólami dławicowymi podczas stosunków płciowych,
- pacjenci, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy występowała niewydolność serca co najmniej 2 stopnia według klasyfikacji NYHA (New York Heart Association),
- pacjenci z niekontrolowanymi arytmiami, niedociśnieniem (<90/50 mm Hg) lub niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym,
- pacjenci, którzy utracili wzrok w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5.
- pacjenci stosujący jednocześnie leki pobudzające cyklazę guanylową, takie jak riocyguat.

Szczegółowe przeciwwskazania do stosowania leku zamieszczono w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Przed zastosowaniem leku, w celu oceny możliwości stosowania, należy skorzystać z narzędzia diagnostycznego (punkt 3 oraz 8).

3. Narzędzie diagnostyczne (kwestionariusz).

Do każdego opakowania produktu leczniczego Tadalafil Mensil dołączone jest narzędzie diagnostyczne (kwestionariusz dla pacjenta), który bada możliwość zastosowania leku. Należy pamiętać, żeby zalecić pacjentowi wypełnienie kwestionariusza (narzędzia diagnostycznego) przed przyjęciem leku. Celem stosowania narzędzia diagnostycznego jest samodzielna ocena możliwości bezpiecznego stosowania leku przez pacjenta bez konsultacji z lekarzem. W przypadku jeśli pacjent zwróci się do farmaceuty z pytaniami odnośnie wypełnionego już przez siebie kwestionariusza, prosimy o udzielenie mu pomocy w celu odpowiedzi na pytanie, czy może stosować produkt leczniczy.

4. Inne ważne informacje.

Należy zalecić pacjentowi wypełnienie kwestionariusza dla pacjenta wydając produkt leczniczy Tadalafil Mensil. Kwestionariusz znajduje się również na końcu tej Informacji. Należy zwrócić uwagę, kwestionariusz dołączony do produktu leczniczego Tadalafil Mensil różni się od kwestionariusza dla leku Mensil, 25 mg (syldenafil), Mensil Max 50 mg (syldenafil). Następnie należy zachęcić pacjenta do przeczytania ulotki dołączonej do opakowania produktu leczniczego Tadalafil Mensil.

Farmaceuta, który wydaje produkt leczniczy Tadalafil Mensil, powinien odpowiednio poinstruować pacjenta w zakresie poprawnego stosowania tego produktu leczniczego. Produkt leczniczy zawierający tadalafil 10 mg jest przyjmowany tylko w razie potrzeby. Występują istotne różnice w dawkowaniu sildenafilu i tadalafilu tj. sildenafil może być przyjmowany z częstotliwością raz na dobę, zaś w przypadku produktu Tadalafil Mensil **pacjent powinien stosować lek nie częściej niż raz w tygodniu**.

Jeśli pacjent przewiduje częste stosowanie leku Tadalafil Mensil (tzn. co najmniej dwa razy na tydzień), należy zalecić pacjentowi kontakt z lekarzem, który może rozważyć zastosowanie niższej dawki leku w schemacie raz na dobę.

Jeżeli pacjent zapyta o stosowany przez siebie produkt leczniczy (lub produkty lecznicze), którego nazwa nie jest wymieniona w kwestionariuszu, zweryfikuj i poinformuj pacjenta czy dany produkt leczniczy zawiera substancję czynną wymienioną w kwestionariuszu i czy występuje ryzyko potencjalnie niebezpiecznych interakcji z tadalafilami (więcej informacji znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego).

Tadalafil wchodzi w klinicznie ważne farmakodynamiczne interakcje z **organicznymi azotanami** oraz lekami uwalniającymi tlenek azotu, które działają przez zwiększenie stężenia cGMP (cykliczny guanozyno-3',5'-monofosforan). Przykłady takich leków to: Nitrocard, Nitromint, Sustonit, Nitroderm, Sorbonit, Effox, Isosorbide mononitrate Vitabalans, Isosorbide mononitrate Accord, Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard, Galpent, Pentaerythritol compositum, Molsidomina WZF, Angedil, Nicorandil Dexcel Pharma. Tadalafil może powodować istotne nasilenie działania hipotensyjnego tych produktów.

W konsekwencji **łączone stosowanie tadalafilu z azotanami lub lekami uwalniającymi tlenek azotu jest przeciwwskazane**.

Ze względu na długi okres półtrwania (T1/2) tadalafilu, **azotanów nie można** przyjmować przez **co najmniej 48 godzin** po zastosowaniu tadalafilu (w przypadku sildenafilu okres ten wynosi 24 godziny).

Zalecane jest zwrócenie szczególnej uwagi pacjenta na następujące kwestie:

- choroby sercowo-naczyniowe (patrz punkt 2);
- utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION) (patrz punkt 2). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nagłych zaburzeń widzenia, pacjent powinien przerwać przyjmowanie produktu leczniczego Tadalafil Mensil i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem;
- jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym tadalafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat (patrz punkt 2);
- możliwe interakcje z lekami wymienionymi w kwestionariuszu (więcej informacji znajdziesz w Charakterystyce Produktu Leczniczego).
- zaburzeń ucha i błędnika – do rzadkich działań niepożądanych, zgłaszanych przez pacjentów przyjmujących tadalafil w badaniach klinicznych, należała utrata słuchu.

5. Uzupełniające porady dla pacjentów.

Należy poinformować pacjenta, że zaburzenia wzdodu mogą mieć związek z innymi schorzeniami (np. nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe). Należy zalecić pacjentowi, żeby w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia stosowania leku Tadalafil Mensil udał się do lekarza w celu zdiagnozowania potencjalnych schorzeń i czynników ryzyka związanych z zaburzeniami erekcji.

Należy udzielić pacjentowi porad dotyczących zdrowego stylu życia, w tym zalecić mu:

- redukcję masy ciała,
- rzucenie palenia,
- ograniczenie alkoholu/używek,
- regularne ćwiczenia,
- zmniejszenie stresu.

6. Informacja na temat działań niepożądanych.

Do najczęstszych działań niepożądanych tadalafilu należą bóle głowy, nagłe zaczerwienienie twarzy, przekrwienie błony śluzowej nosa, niestrawność, bóle pleców, bóle mięśni oraz bóle kończyn.

Układ krążenia:

Po wprowadzeniu leku do obrotu i (lub) w badaniach klinicznych zgłaszano ciężkie działania niepożądane ze strony układu krążenia, takie jak: zawał mięśnia sercowego, nagłe zgonu sercowe, niestabilna dławica piersiowa, komorowe zaburzenia rytmu serca, udar, przemijające napady niedokrwienne (ang. transient ischemic attacks, TIA), bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca i częstoskurcz. Większość pacjentów, u których wystąpiły te działania, była obciążona czynnikami ryzyka chorób układu krążenia. Nie jest jednak możliwe ustalenie w sposób jednoznaczny, czy zgłaszane działania były związane bezpośrednio z tymi czynnikami ryzyka, tadalafilami, aktywnością seksualną lub połączeniem tych i innych czynników.

Szczegółowe informacje na temat działań niepożądanych możesz znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

7. Zgłaszanie działań niepożądanych

Wszelkie podejrzane działania niepożądane proszę zgłaszać do:

• Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>.

• Podmiotu odpowiedzialnego: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A., ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław, e-mail: ndl@hasco-lek.pl; tel.: (+48) 71 321 01 49.

8. Kwestionariusz dla pacjenta.

KWESTIONARIUSZ DLA PACJENTA

Lek Tadalafil Mensil wskazany jest do stosowania u dorosłych mężczyzn (w wieku powyżej 18 lat) w leczeniu zaburzeń wzrodu (erekcji).

Zaburzenia erekcji mogą mieć różne przyczyny, zarówno o podłożu psychogennym (np. stres, przemęczenie, lęki, zaburzenia depresyjne), jak i organicznym (w przebiegu chorób, nalogów, w następstwie przyjmowania leków). Rozpoznanie zaburzeń erekcji nie musi mieć trwałego charakteru. Zaburzenia erekcji mogą jednak świadczyć o rozwoju poważnych chorób układu sercowo-naczyniowego, nerwowego, cukrzycy czy chorób urologicznych. Uważa się je za jeden z najistotniejszych markerów (wskazników) występowania choroby niedokrwiennej serca, która może prowadzić do zawału. Dlatego nigdy nie należy lekceważyć występujących objawów.

Aby ocenić, czy może Pan zastosować lek Tadalafil Mensil, należy skorzystać z poniższego narzędzia diagnostycznego.

1. Należy wypełnić poniższy kwestionariusz.

Kwestionariusz zawiera pięć pytań, które pomogą rozpoznać ewentualne zaburzenia wzrodu i wskazać na potrzebę leczenia. Każde pytanie kwestionariusza opatrzone jest kilkoma odpowiedziami. Spośród odpowiedzi na każde pytanie należy wybrać tylko jedną – tę, która najlepiej określa Pańskie odczucie.

W ciągu ostatnich 4 tygodni:						
	0	1	2	3	4	5
Jak ocenia Pan swoją pewność, że mógłby Pan mieć i utrzymać wzród prąca?		Bardzo nisko	Nisko	Umiarkowanie	Wysoko	Bardzo wysoko
Jeśli wzród prąca wystąpił w wyniku stymulacji seksualnej, jak często był nasilony na tyle, że umożliwiał wprowadzenie prąca do pochwy partnerki?	0 Nie podejmowałem stosunków płciowych	1 Prawie nigdy lub nigdy	2 Kilukrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)	3 Czasami (mniej więcej co drugi raz)	4 Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)	5 Prawie zawsze lub zawsze
Jak często w czasie stosunku seksualnego był Pan w stanie utrzymać wzród prąca po wprowadzeniu prąca do pochwy partnerki?	0 Nie podejmowałem stosunków płciowych	1 Prawie nigdy lub nigdy	2 Kilukrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)	3 Czasami (mniej więcej co drugi raz)	4 Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)	5 Prawie zawsze lub zawsze
Jak trudno było Panu utrzymać erekcję do zakończenia stosunku płciowego?	0 Nie podejmowałem stosunków płciowych	1 Niezwyczajnie trudno	2 Bardzo trudno	3 Trudno	4 Nieco trudno	5 Prawie zawsze nie miałem trudności
Jeśli podejmował Pan stosunek seksualny, jak często dostarczał on Panu zadowolenia?	0 Nie podejmowałem stosunków płciowych	1 Prawie nigdy lub nigdy	2 Kilukrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)	3 Czasami (mniej więcej co drugi raz)	4 Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)	5 Prawie zawsze lub zawsze

UZYSKANY WYNIK (suma punktów).....

Uzyskany wynik*	Interpretacja wyniku	Wskazania do zastosowania leku Tadalafil Mensil
22-25	Brak zaburzeń erekcji	Brak wskazań do stosowania leku
17-21	Łagodne zaburzenia erekcji	Można zastosować lek Tadalafil Mensil, po uprzednim skorzystaniu z dołączonego kwestionariusza .
12-16	Łagodne do umiarkowanych zaburzenia erekcji	
8-11	Umiarkowane zaburzenia erekcji	
5-7	Ciężkie zaburzenia erekcji	

* jeżeli nie podejmował Pan stosunków płciowych, to na podstawie uzyskanego wyniku nie można ocenić, czy występują u Pana zaburzenia erekcji, dlatego przed zastosowaniem leku Tadalafil Mensil konieczna jest konsultacja lekarska.

2. Jeżeli wynik uzyskany w kwestionariuszu potwierdził istnienie u Pana wskazań do stosowania leku Tadalafil Mensil i chciałby Pan go zastosować, to należy odpowiedzieć na poniższe pytania.

Czy ma Pan zdiagnozowane przez lekarza którekolwiek z poniższych schorzeń?	Tak / Nie wiem	Nie
Niestabilna choroba wieńcowa (dławica piersiowa, bóle w klatce piersiowej)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zawał serca lub udar mózgu przeżyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ciężkie choroby wątroby (np. marskość)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (dziedziczne nieprawidłowości dotyczące kształtu czerwonych krwinek)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Białaczka (choroba nowotworowa krwi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szpiczak mnogoci (choroba nowotworowa szpiku kostnego)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrata wzroku w jednym oku z innego powodu niż uraz, zaćma lub jaskra (tzw. „porażenie oka”)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Choroby prąca (skrzywienie prąca utrudniające penetrację, choroba Peyroniego - stwardnienie plastyczne prąca)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Czy zaobserwował Pan u siebie któryś z poniższych objawów związanych z chorobami serca/krażenia?		
Wyraźne pogorszenie samopoczucia w ciągu ostatniego miesiąca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ból za mostkiem w klatce piersiowej w ciągu ostatnich 2 miesięcy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duszność, kołatanie serca lub wyraźne zmęczenie podczas zwykłych, codziennych czynności takich, jak mycie lub ubieranie się	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Częste odczuwanie przyspieszonego lub nierównego bicia serca (arytmia), które NIE jest leczone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zwykle niskie ciśnienie tętnicze krwi (poniżej 90/50 mmHg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zwykle wysokie ciśnienie krwi (powyżej 150/90 mmHg), które NIE jest leczone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Częste zawroty głowy, wrażenie omdlewania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Czy stosuje Pan leki używane do łagodzenia objawów choroby wieńcowej (choroby niedokrwiennej serca, dławicy piersiowej, bólu w klatce piersiowej), których stosowanie wraz z tadalafillem jest przeciwwskazane?

	Tak / Nie wiem	Nie
- Nitrogliceryna (np. Nitrocard, Nitromint, Nitroderm, Sustonit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Izosorbid (np. Sorbonit, Efox, Mono Mack, Mononit, Olicard, Monosan, Isosorbide mononitrate Vitabalans, Isosorbidi mononitras Accord)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Pentaerytrytol (np. Pentarythritol compositum, Galpent)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Molsidomina (np. Molsidomina WZF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Nikorandyl (np. Angedil, Nicorandil Dexcel Pharma)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Czy stosuje Pan riocyguat (np. Adempas) w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach)?

	Tak / Nie wiem	Nie
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Czy stosuje Pan środki uwalniające tlenek azotu, tzw. poppers?

Czy przyjmuje Pan leki stosowane w leczeniu rozrostu gruczołu krokowego (prostaty, stercza) i/lub w nadciśnieniu tętniczym? Do tej grupy należą m.in.:

- Alfuzosyna (np. Alfabax, AlfuLEK, Alfuron, Alfuzostad, Alugen, Dafaz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Doksazosyna (np. Adadox, Apo-Doxan, Cardura, Doxagen, Doxalong, Doxanorm, Doxar, Doxazosin, Doxonex, Doxorion, Dozox, Kamiren, Zoxon)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dutasteryd (np. Adadut, Avodart, Davoster, Dufast, Dutasteride, Dutasteryd, Dutrys, Findarts)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Finasteryd (np. Adaster, Androster, Antiprost, Apo-Fina, FinaGen, Finahit, Finamef, Finaran, Finaride, Finaster, Finasterid Stada, Finasteride, Finasteridum Bluefish, Finiprost, Finpros, Finxta, Hyplafin, Penester, Proscar, Symasteride, Uronezyr, Zasterid)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sylodosyna (np. Pirseo, Sidarso, Silodyx, Urorec)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Tamsulozyna (np. Adatam, Apo-Tamis, Bazetham, Duitam, Duodart, Duotix, Dutamsol, Dutaprostam, Dutasteride Tamsulosin, Dutate, Dutrozen, Findarts Duo, Fokusin, Landulosin, Marumax, Miktosan, OMI-TAM, Omnic, Omsal, Prostammic, Ranlosin, Suprostiv, Symlosin, Tadumix, Tamduro, Tamiron, TamisPRAS, Tamoptim, Tamsiger, Tamsudil, Tamsugen, Tamsulosin, Tamur, Tanyz, Twinpros, Unisol, Uprox, Urostat, Vesomni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Terazosyna (np. Komam, Hytrin)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Czy przyjmuje Pan leki będące tzw. inhibitorami izoenzymu CYP3A4? Do tej grupy należą m.in.:

- Niektóre antybiotyki, takie jak: erytromycyna (np. Davercin, Erythromycinum TZF), klarytromycyna (np. Apiclar, Fromilid, Klabax, Klabion, Klabiotic, Klacid, Klarmin, Lekoklar, Taclar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Niektóre leki przeciwgrzybicze, takie jak: ketokonazol (obecnie stosowany w zespole Cushinga, np. Ketokonazol, Ketoconazole Hasco, Ketoconazole HRA), intrakonazol (np. Ipozumax, Itraconazole, ItraGen, Itrax, Itrokast, Itromyx, Orungal, Trioxal), flukonazol (np. Candifluc, Diflucan, Flucofast, Fluconazin, Fluconazole B. Braun 2 mg/ml, Fluconazole, Flucorta, Flukonazol roztwór do infuzji 2 mg/ml, Flumycan, Fluxazol, Locaring, Mycomax, Mycosyst)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Leki stosowane w leczeniu infekcji wirusem HIV (tzw. inhibitory proteazy), takie jak: rytonawir (np. Norvir, Ritonawir Accord, Ritonawir Aurovitas, Ritonawir Mylan, Ritonawir Sandoz), sakwinawir (np. Invirase)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Czy stosuje Pan już inne metody leczenia zaburzeń erekcji?

	Tak / Nie wiem	Nie
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ODCZYTAJ WYNIK KWESTIONARIUSZA:

NIE MOŻE Pan zastosować leku Tadalafil Mensil bez konsultacji z lekarzem!

Przynajmniej 1x TAK lub NIE WIEM

MOŻE Pan zastosować lek Tadalafil Mensil

Wszystkie NIE

Przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę dla pacjenta dołączoną do opakowania. Lek NIE jest przeznaczony do stałego, codziennego przyjmowania. Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz zastosować lek Tadalafil Mensil, przed użyciem leku skonsultuj się z farmaceutą.