

KWESTIONARIUSZ DLA PACJENTA

Lek Tadalafil Mensil wskazany jest do stosowania u dorosłych mężczyzn (w wieku powyżej 18 lat) w leczeniu zaburzeń wzrodu (erekcji).

Zaburzenia erekcji mogą mieć różne przyczyny, zarówno o podłożu psychogennym (np. stres, przemęczenie, lęki, zaburzenia depresyjne), jak i organicznym (w przebiegu chorób, nalogów, w następstwie przyjmowania leków). Rozpoznanie zaburzeń erekcji nie musi mieć trwałego charakteru. Zaburzenia erekcji mogą jednak świadczyć o rozwoju poważnych chorób układu sercowo-naczyniowego, nerwowego, cukrzycy czy chorób urologicznych. Uważa się je za jeden z najistotniejszych markerów (wskazników) występowania choroby niedokrwiennej serca, która może prowadzić do zawału. Dlatego nigdy nie należy lekceważyć występujących objawów.

Aby ocenić, czy może Pan zastosować lek Tadalafil Mensil, należy skorzystać z poniższego narzędzia diagnostycznego.

1. Należy wypełnić poniższy kwestionariusz.

Kwestionariusz zawiera pięć pytań, które pomogą rozpoznać ewentualne zaburzenia wzrodu i wskazać na potrzebę leczenia. Każde pytanie kwestionariusza opatrzone jest kilkoma odpowiedziami. Spośród odpowiedzi na każde pytanie należy wybrać tylko jedną – tę, która najlepiej określa Pańskie odczucie.

W ciągu ostatnich 4 tygodni:						
	0	1	2	3	4	5
Jak ocenia Pan swoją pewność, że mógłby Pan mieć i utrzymać wzród prąca?		Bardzo nisko	Nisko	Umiarkowanie	Wysoko	Bardzo wysoko
Jeśli wzród prąca wystąpił w wyniku stymulacji seksualnej, jak często był nasilony na tyle, że umożliwiał wprowadzenie prąca do pochwy partnerki?	0 Nie podejmowałem stosunków płciowych	1 Prawie nigdy lub nigdy	2 Kilukrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)	3 Czasami (mniej więcej co drugi raz)	4 Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)	5 Prawie zawsze lub zawsze
Jak często w czasie stosunku seksualnego był Pan w stanie utrzymać wzród prąca po wprowadzeniu prąca do pochwy partnerki?	0 Nie podejmowałem stosunków płciowych	1 Prawie nigdy lub nigdy	2 Kilukrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)	3 Czasami (mniej więcej co drugi raz)	4 Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)	5 Prawie zawsze lub zawsze
Jak trudno było Panu utrzymać erekcję do zakończenia stosunku płciowego?	0 Nie podejmowałem stosunków płciowych	1 Niezwyczajnie trudno	2 Bardzo trudno	3 Trudno	4 Nieco trudno	5 Prawie zawsze nie miałem trudności
Jeśli podejmował Pan stosunek seksualny, jak często dostarczał on Panu zadowolenia?	0 Nie podejmowałem stosunków płciowych	1 Prawie nigdy lub nigdy	2 Kilukrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)	3 Czasami (mniej więcej co drugi raz)	4 Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)	5 Prawie zawsze lub zawsze

UZYSKANY WYNIK (suma punktów).....

Uzyskany wynik*	Interpretacja wyniku	Wskazania do zastosowania leku Tadalafil Mensil
22-25	Brak zaburzeń erekcji	Brak wskazań do stosowania leku
17-21	Łagodne zaburzenia erekcji	Można zastosować lek Tadalafil Mensil, po uprzednim skorzystaniu z dołączonego kwestionariusza .
12-16	Łagodne do umiarkowanych zaburzenia erekcji	
8-11	Umiarkowane zaburzenia erekcji	
5-7	Ciężkie zaburzenia erekcji	

* jeżeli nie podejmował Pan stosunków płciowych, to na podstawie uzyskanego wyniku nie można ocenić, czy występują u Pana zaburzenia erekcji, dlatego przed zastosowaniem leku Tadalafil Mensil konieczna jest konsultacja lekarska.

2. Jeżeli wynik uzyskany w kwestionariuszu potwierdził istnienie u Pana wskazań do stosowania leku Tadalafil Mensil i chciałby Pan go zastosować, to należy odpowiedzieć na poniższe pytania.

Czy ma Pan zdiagnozowane przez lekarza którekolwiek z poniższych schorzeń?	Tak / Nie wiem	Nie
Niestabilna choroba wieńcowa (dławica piersiowa, bóle w klatce piersiowej)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zawał serca lub udar mózgu przebyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ciężkie choroby wątroby (np. marskość)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (dziedziczne nieprawidłowości dotyczące kształtu czerwonych krwinek)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Białaczka (choroba nowotworowa krwi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szpiczak mnogi (choroba nowotworowa szpiku kostnego)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrata wzroku w jednym oku z innego powodu niż uraz, zaćma lub jaskra (tzw. „porażenie oka”)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Choroby prącia (skrzywienie prącia utrudniające penetrację, choroba Peyroniego - stwardnienie plastyczne prącia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Czy zaobserwował Pan u siebie któryś z poniższych objawów związanych z chorobami serca/krażenia?		
Wyraźne pogorszenie samopoczucia w ciągu ostatniego miesiąca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ból za mostkiem w klatce piersiowej w ciągu ostatnich 2 miesięcy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duszność, kołatanie serca lub wyraźne zmęczenie podczas zwykłych, codziennych czynności takich, jak mycie lub ubieranie się	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Częste odczuwanie przyspieszonego lub nierównego bicia serca (arytmia), które NIE jest leczone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zwykle niskie ciśnienie tętnicze krwi (poniżej 90/50 mmHg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zwykle wysokie ciśnienie krwi (powyżej 150/90 mmHg), które NIE jest leczone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Częste zawroty głowy, wrażenie omdlewania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Czy stosuje Pan leki używane do łagodzenia objawów choroby wieńcowej (choroby niedokrwiennej serca, dławicy piersiowej, bólu w klatce piersiowej), których stosowanie wraz z tadalafillem jest przeciwwskazane?

	Tak / Nie wiem	Nie
- Nitrogliceryna (np. Nitrocard, Nitromint, Nitroderm, Sustonit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Izosorbid (np. Sorbonit, Efoxx, Mono Mack, Mononit, Olicard, Monosan, Isosorbide mononitrate Vitabalans, Isosorbidi mononitras Accord)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Pentaerytrytol (np. Pentarythritol compositum, Galpent)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Molsidomina (np. Molsidomina WZF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Nikorandyl (np. Angedil, Nicorandil Dexcel Pharma)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Czy stosuje Pan riocyguat (np. Adempas) w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach)?

	Tak / Nie wiem	Nie
Czy stosuje Pan środki uwalniające tlenek azotu, tzw. poppers?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Czy przyjmuje Pan leki stosowane w leczeniu rozrostu gruczołu krokowego (prostaty, stercza) i/lub w nadciśnieniu tętniczym? Do tej grupy należą m.in.:

- Alfuzosyna (np. Alfabax, AlfuLEK, Alfuron, Alfuzostad, Alugen, Dafaz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Doksazosyna (np. Adadox, Apo-Doxan, Cardura, Doxagen, Doxalong, Doxanorm, Doxar, Doxazosin, Doxonex, Doxorion, Dozox, Kamiren, Zoxon)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dutasteryd (np. Adadut, Avodart, Davoster, Duster, Dutasteride, Dutasteryd, Dutrys, Findarts)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Finasteryd (np. Adaster, Androster, Antiprost, Apo-Fina, FinaGen, Finahit, Finamef, Finaran, Finaride, Finaster, Finasterid Stada, Finasteride, Finasteridum Bluefish, Finiprost, Finpros, Finxta, Hyplafin, Penester, Proscar, Symasteride, Uronezyr, Zasterid)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Sylodosyna (np. Pirseo, Sidarso, Silodyx, Urorec)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Tamsulozyna (np. Adatam, Apo-Tamis, Bazetham, Duitam, Duodart, Duotix, Dutamsol, Dutaprostam, Dutasteride Tamsulosin, Dutatev, Dutrozen, Findarts Duo, Fokusin, Landulosin, Marumax, Miktosan, OMI-TAM, Omnic, Omsal, Prostammic, Ranlosin, Suprostriv, Symlosin, Tadumix, Tamduro, Tamiron, TamisPRAS, Tamoptim, Tamsiger, Tamsudil, Tamsugen, Tamsulosin, Tamur, Tanyz, Twinpros, Unisol, Uprox, Urostat, Vesomni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Terazosyna (np. Komam, Hytrin)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Czy przyjmuje Pan leki będące tzw. inhibitorami izoenzymu CYP3A4? Do tej grupy należą m.in.:

- Niektóre antybiotyki, takie jak: erytromycyna (np. Davercin, Erythromycinum TZF), klarytromycyna (np. Apiclar, Fromilid, Klabax, Klabion, Klabiotic, Klacid, Klarmin, Lekoklar, Taclar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Niektóre leki przeciwgrzybicze, takie jak: ketokonazol (obecnie stosowany w zespole Cushinga, np. Ketokonazol, Ketoconazole Hasco, Ketoconazole HRA), intrakonazol (np. Ipozumax, Itraconazole, ItraGen, Itrax, Itrakast, Itromyx, Orungal, Trioxal), flukonazol (np. Candifluc, Diflucan, Flucofast, Fluconazin, Fluconazole B. Braun 2 mg/ml, Fluconazole, Flucorta, Flukonazol roztwór do infuzji 2 mg/ml, Flumycan, Fluxazol, Locaring, Mycomax, Mycosyst)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Leki stosowane w leczeniu infekcji wirusem HIV (tzw. inhibitory proteazy), takie jak: rytonawir (np. Norvir, Ritonawir Accord, Ritonawir Aurovitas, Ritonawir Mylan, Ritonawir Sandoz), sakwinawir (np. Invirase)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Czy stosuje Pan już inne metody leczenia zaburzeń erekcji?

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------

ODCZYTAJ WYNIK KWESTIONARIUSZA:

NIE MOŻE Pan zastosować leku Tadalafil Mensil bez konsultacji z lekarzem!

Przynajmniej 1x TAK lub NIE WIEM

MOŻE Pan zastosować lek Tadalafil Mensil

Wszystkie NIE

Przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę dla pacjenta dołączoną do opakowania. Lek NIE jest przeznaczony do stałego, codziennego przyjmowania. Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz zastosować lek Tadalafil Mensil, przed użyciem leku skonsultuj się z farmaceutą.